

De gynaecologische echo: onderzoek van de baarmoeder en eierstokken

Bij een gynaecologisch echo-onderzoek worden de baarmoeder (uterus) en de eierstokken (ovaria) bekeken. Met deze beelden kan de echoscopist de vorm, grootte en ligging van de baarmoeder en eierstokken beoordelen. De eileiders (tubae) bevinden zich tussen de baarmoeder en de eierstokken in en zijn met een echo-onderzoek meestal niet te zien en dus niet echoscopisch te beoordelen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

In de meeste gevallen zal een **inwendige** (transvaginale/vaginale) echo worden toegepast. Met een inwendig onderzoek komt de probe dicht bij de baarmoeder en eierstokken. Een volle blaas is niet nodig, maar er mag wel een kleine hoeveelheid urine in de blaas aanwezig zijn. Het onderzoek zelf gebeurt met een dunne, langwerpige probe, waarmee de baarmoeder en de eierstokken vanuit de vagina kunnen worden bekeken. Dit echo-onderzoek is volstrekt veilig en niet pijnlijk. Sommige vrouwen hebben moeite met een inwendige echo. Dit kunt u altijd aangeven bij de echoscopist, die u er dan behulpzaam bij zal zijn. Het onderzoek kan doorgaans probleemloos tijdens de menstruatie plaatsvinden.



Soms wordt er weloverwogen afgezien van een inwendige echo. Zo bijvoorbeeld bij vrouwen die nog nooit geslachtsgemeenschap hebben gehad of die een nare seksuele ervaring hebben gehad in het verleden. Het echo-onderzoek wordt dan in principe **uitwendig** (via de buik) uitgevoerd. Wel kan de beeldvorming hierdoor minder zijn al gaat de echoscopist dan in overleg met u en uw verwijzer/behandelaar op zoek naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie.

Verder wordt er alleen uitwendig gekeken als de inwendige echo onvoldoende informatie verschaft. Bij een uitwendige echo wordt de echoprobe op de buik geplaatst. Door middel van gel op de buik kunnen de baarmoeder en de eierstokken zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor is doorgaans wél een volle blaas nodig. Het kan zijn dat de druk op de volle blaas als onaangenaam ervaren wordt.

Veel voorkomende redenen voor een gynaecologisch echo-onderzoek

Onder andere:

- afwijkend bloedverlies: zeer hevige of pijnlijke menstruaties, bloedverlies tussen de menstruaties door of bloedverlies na de overgang;
- het vermoeden van vleesbomen (myomen) of een vergrote eierstok;
- buikpijn;
- vermoeden van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
- controle van een spiraaltje;
- onvruchtbaarheid.



Echoscopische afbeelding van een baarmoeder. De witte streep in het midden geeft de holte van de baarmoeder weer.